

# 自然薯の主要病害虫防除基準

政田自然農園2015/2/1更新

薬剤名	ムカゴ適用	1年生雑草	青かび病	炭疽病	つる枯病	褐色腐敗病	根腐病	葉渋病	アブラムシ類	ヨトウムシ類	ヤマノイモコガ	ナガイモコガ	コガネムシ類	アザミウマ類	ハダニ類	カンザワハダニ	ネコブセンチュウ	使用倍率・使用量	使用方法	農薬安全使用基準	
																				使用時期 (収穫前日数)	使用回数
植付前処理剤	ネマトリンエース粒剤	◎																20kg/10a	全面土壌混和	植付前	1回
	アドマイヤー1粒剤	◎											○					4kg/10a	植溝土壌混和	植付時	1回
	クロルピクリン錠剤		○				○											1穴当り1錠	30×30cm毎に1錠	植付17日前	1回
	ガスタード微粒剤 (バスアミド微粒剤)		○				○	○										20～30kg/10a	所定量を均一に散布して 土壌混和	植付21日前	1回
	ベンレートT水和剤20	◎		○			○											100倍～200倍	10分間種芋浸漬	植付前	1回
	ベルコートフロアブル			○														200倍	10分間種芋浸漬	植付前	1回
	ティービック水和剤							○										50倍	約2秒間種芋浸漬	植付前	1回
	ベンレートT水和剤20							○										20倍	約2秒間種芋浸漬	植付前	1回
殺菌剤	トップジンM水和剤	◎		○				○										800倍	散布	7日	5回
	ジマンダイセン水和剤			○				○										400倍～600倍	散布	21日	4回
	ダコニール1000	◎		○	○			○										1000倍	散布	30日	6回
	ラピライト水和剤			○				○										400倍	散布	14日	4回
	ベルコートフロアブル			○				○										1000倍	散布	7日	5回
	キノドー水和剤40							○										600倍	散布	14日	5回
	ストロビーフロアブル	◎						○										2000倍	散布	7日	3回
	コサイドDF							○										1000倍	散布	—	—
	フロンサイド水和剤							○										2000倍	散布	14日	4回
	ベルコート水和剤							○										1000倍～2000倍	散布	7日	5回
殺虫剤	トレボン乳剤	◎							○	○	○							1000倍	散布	14日	3回
	モスピラン水溶剤								○				○					4000倍	散布	7日	3回
	DDVP乳剤50	◎							○									1000倍～2000倍	散布	14日	6回
	マブリック水和剤20								○	○	○							2000倍～4000倍	散布	7日	2回
	アディオン乳剤								○	○			○					2000倍～3000倍	散布	7日	5回
	コテツフロアブル	◎										○				○		2000倍	散布	3日	2回
	マイトコーネフロアブル														○			1000倍	散布	3日	1回
	コロマイト乳剤	◎															○	1000倍	散布	7日	2回
	アタブロン乳剤	◎											○					2000倍	散布	3日	3回
	アディオン乳剤								○	○			○					2000倍～3000倍	散布	7日	5回
	バイジット粒剤												○					9kg/10a	株元土壌表面散布	45日	3回
	トレボン粉剤DL									○								4kg/10a	散布	14日	3回